



Centre universitaire de santé McGill  
McGill University Health Centre  
The Best Care for Life

Portefeuille de l'éducation du CUSM  
The MUHC Education Portfolio

PRET SURE  
Parcours de rétablissement chirurgical du CUSM  
MUHC Surgery Recovery Program

MMF  
Programme de rétablissement chirurgical du CUSM  
MUHC Surgery Recovery Program

# Guide du parcours de retour chez-soi: Chirurgie du poumon

	Jour de la chirurgie	1 jour après la chirurgie	2 jours après la chirurgie	3 jours après la chirurgie	4 jours après la chirurgie
Exercices de respiration	 10 x chaque heure Assis	 10 x chaque heure Assis	 10 x chaque heure Assis	 10 x chaque heure Assis	 10 x chaque heure Assis
Activités	 Gardez la tête du lit à 45 degré M'asseoir	 Marchez la longueur de corridor 2 x M'asseoir 3 X et restez hors du lit selon ma tolérance	 Marchez la longueur de corridor 2 x M'asseoir 3 X et restez hors du lit total de 8 heures	 Marchez la longueur de corridor 3-5 x M'asseoir 3 X et restez hors du lit total de 8 heures	 Marchez la longueur de corridor 3-5 x M'asseoir 3 X et restez hors du lit total de 8 heures
Contrôle de la douleur	 Épidural La douleur devra être maintenue sous 4	 Épidural La douleur devra être maintenue sous 4	 Épidural La douleur devra être maintenue sous 4	 Pilules La douleur devra être maintenue sous 4	 Pilules La douleur devra être maintenue sous 4
Nutrition	 SEULEMENT des liquides	 Nourriture solide, fruits et légumes	 Nourriture solide, fruits et légumes	 Nourriture solide, fruits et légumes	 Nourriture solide, fruits et légumes
Tubes et drains					

# Guide du parcours de retour chez-soi: Chirurgie du poumon

	Jour de la chirurgie	1 jour après la chirurgie	2 jours après la chirurgie	3 jours après la chirurgie	4 jours après la chirurgie
<b>Exercices de respiration</b>	Commencer mes exercices de respiration	Continuer à faire mes exercices de respiration	Continuer à faire mes exercices de respiration	Continuer à faire mes exercices de respiration	Continuer à faire mes exercices de respiration
<b>Activités</b>	Avec de l'aide, m'asseoir dans une chaise cette même journée  Commencer à faire mes exercices de mes chevilles	Avec de l'aide, marcher la longueur du corridor 2 fois durant la journée  M'asseoir à la chaise 3 fois, 30 à 60 minutes chaque fois  Selon ma tolérance, m'asseoir à la chaise ou marcher, le plus possible	Avec de l'aide, marcher la longueur du corridor 3 fois durant la journée  M'asseoir à la chaise 3 fois, 30 à 60 minutes chaque fois  Être sorti du lit pour au moins 8 heures durant la journée	Avec de l'aide, marcher la longueur du corridor 3 à 5 fois durant la journée  M'asseoir à la chaise 3 fois, 30 à 60 minutes chaque fois  Être sorti du lit pour au moins 8 heures durant la journée	Rentrer à la maison et continuer ma convalescence
<b>Contrôle de la douleur</b>	Dire à mon infirmière si ma douleur atteint 4/10 selon l'échelle de douleur	Dire à mon infirmière si ma douleur atteint 4/10 selon l'échelle de douleur	Dire à mon infirmière si ma douleur atteint 4/10 selon l'échelle de douleur	L'épidurale sera enlevée et je commencerai à prendre des pilules, au besoin, pour contrôler ma douleur  Dire à mon infirmière si ma douleur atteint 4/10 selon l'échelle de douleur	Continuer à prendre des pilules pour contrôler ma douleur  Dire à mon infirmière si ma douleur atteint 4/10 selon l'échelle de douleur
<b>Nutrition</b>	Boire des liquides  Toujours m'asseoir sur une chaise lorsque je bois	Recevoir des aliments solides, et une diète normale  M'asseoir sur une chaise pour tous mes repas	Continuer à recevoir des aliments solides, et une diète normale  M'asseoir sur une chaise pour tous mes repas	Continuer à recevoir des aliments solides, et une diète normale  M'asseoir sur une chaise pour tous mes repas	Continuer avec ma diète normale et régulière  M'asseoir sur une chaise pour tous mes repas
<b>Tubes et drains</b>	Je vais avoir :  - Une épidurale - Une intraveineuse (sérum) - Un masque d'oxygène - Un drain urinaire - Un drain thoracique	Aller à la toilette si mon drain urinaire est enlevé  L'intraveineuse (le sérum) sera enlevée lorsque je mange et bois	L'intraveineuse (le sérum) sera enlevée lorsque je mange et bois	Le drain thoracique sera enlevé  L'épidurale sera enlevée	Aucun tube ou drain lorsque je quitte pour la maison